

Tp.HCM, ngày 17 tháng 9 năm 2026

KẾT QUẢ GIÁ TRỊ CANH TÁC, GIÁ TRỊ SỬ DỤNG
GIỐNG DƯA LEO LAI F1 CUMI 263

Tên tổ chức, cá nhân tự công bố lưu hành giống cây trồng: Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam.

Địa chỉ: 282 Lê Văn Sỹ, Phường Tân Sơn Hòa, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.38442414 Fax: 028.38442387 Email: southernseed@ssc.com.vn

1. Tên giống cây trồng tự công bố lưu hành giống: CUMI 263

Tên loài : Dưa leo - *Cucumis sativus* L.

Cấp giống: Hạt giống lai F1

Nguồn gốc giống: Nhập nội, tuyển chọn qua khảo nghiệm (tên giống khảo nghiệm Số 03)

2. Kết quả giá trị canh tác, giá trị sử dụng: của giống Dưa leo lai F1 CUMI 263 đạt theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 05:2020/SSC do CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM xây dựng và công bố áp dụng:

TT	Chỉ tiêu	TCCS 05:2020/SSC	CUMI 263	Nhận xét
1.	Ngày mọc (ngày)	≤ 10 ngày	5	Đạt
2.	Kiểu sinh trưởng	1-Hữu hạn 2-Vô hạn	2-Vô hạn	Đạt
3.	Màu sắc gai quả	0-Không gai 1-Trắng 2-Nâu xám 3-Nâu đậm	1-Trắng	Đạt
4.	Hình dạng quả	1-Hình cầu 2-Hình trứng 3-Hình elip 4-Hình thon dài 5-Hình trụ 6-Hình cong cánh cung	5-Hình trụ	Đạt



TT	Chỉ tiêu	TCCS 05:2020/SSC	CUMI 263	Nhận xét
5.	Màu sắc nền vỏ quả	1-Xanh trắng 2-Xanh nhạt 3-Xanh trung bình 4-Xanh đậm	3-Xanh trung bình	Đạt
6.	Chiều dài quả (cm)	≥ 15 cm	18 – 20	Đạt
7.	Đường kính quả (cm)	≤ 5 cm	2,7 – 2,9	Đạt
8.	Vị đắng ở đầu quả có cuống	1-Không 2-Có	1-Không	Đạt
9.	Năng suất (tấn/ha)	≥ 30 tấn/ha	32,5 – 60,0	Đạt
10.	Thời gian sinh trưởng (ngày)	≤ 130 ngày	60 - 75	Đạt
11.	Bệnh giả sương mai <i>Pseudoperonospora cubensis</i> Berk and Curt	1-Không nhiễm bệnh 2-Nhiễm nhẹ: < 20% diện tích lá nhiễm bệnh 3-Nhiễm trung bình: từ 20 đến 40% diện tích lá nhiễm bệnh 4-Nhiễm nặng: hơn 40-60% diện tích lá nhiễm bệnh 5-Nhiễm rất nặng: > 60% diện tích lá nhiễm bệnh	2-Nhiễm nhẹ: < 20% diện tích lá nhiễm bệnh	Đạt
12.	Bệnh phấn trắng <i>Erysiphe cichoracearum</i> D.C	1-Không nhiễm bệnh 2-Nhiễm nhẹ: < 20% diện tích lá nhiễm bệnh 3-Nhiễm trung bình: từ 20 đến 40% diện tích lá nhiễm bệnh 4-Nhiễm nặng: hơn 40-60% diện tích lá nhiễm bệnh 5-Nhiễm rất nặng: > 60% diện tích lá nhiễm bệnh	2-Nhiễm nhẹ: < 20% diện tích lá nhiễm bệnh	Đạt

34683
NG TY
PHÂN
CÂY TRỒNG
N NAM
ĐA-TP.HỒ

Kết quả khảo nghiệm có kiểm soát tính chịu hạn của giốngdưa leo lai F1 CUMI 263 (sau khi gây hạn nhân tạo): Sau 3 ngày không tưới thì cây chỉ héo nhẹ và phục hồi khi trời mát.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Lương Lấn Lài



Số: /TCBLH-SSC

Tp.HCM, ngày 17 tháng 9 năm 2026

BẢN TỰ CÔNG BỐ LƯU HÀNH GIỐNG CÂY TRỒNG

Tên tổ chức, cá nhân tự công bố lưu hành giống cây trồng: Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam.

Mã số thuế: 0302634683

Địa chỉ: 282 Lê Văn Sỹ, Phường Tân Sơn Hòa, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.38442414 Fax: 028.38442387 Email: southernseed@ssc.com.vn

1. Tên giống cây trồng tự công bố lưu hành giống: CUMI 263

Tên loài : Dưa leo - *Cucumis sativus* L.

Cấp giống: Hạt giống lai F1

Nguồn gốc giống: Nhập nội, tuyển chọn qua khảo nghiệm (tên giống khảo nghiệm Số 03)

2. Phạm vi lưu hành của giống cây trồng: Các vùng trồng dưa leo trên phạm vi cả nước.

3. Thời gian bắt đầu lưu hành giống cây trồng: Từ khi thông tin về giống được đăng tải trên trang web của công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam

<https://ssc.com.vn/vi/r-d/tu-cong-bo-luu-hanh/>

4. Thông tin về giống cây trồng

4.1. Đặc tính của giống: CUMI 263

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính/Điểm	Trạng thái biểu hiện
1	Kiểu sinh trưởng	2	Vô hạn
2	Nhóm giống	1	Nhóm quả to
3	Ngày mọc	ngày	5 -7
4	Thời gian sinh trưởng	ngày	60 - 75
5	Màu sắc gai quả	1	Trắng
6	Hình dạng quả	5	Hình trụ
7	Màu sắc nền vỏ quả	3	Xanh trung bình
8	Chiều dài quả	cm	18 – 20
9	Đường kính quả	cm	2,7 – 2,9
10	Vị đắng ở đầu quả có cuống	1	Không
11	Năng suất	tấn/ha	32,5 – 60,0
12	Bệnh giả sương mai <i>Pseudoperonospora cubensis</i> Berk and Curt	2	Nhiễm nhẹ
13	Bệnh phấn trắng <i>Eryshiphe cichoracearum</i> D.C	2	Nhiễm nhẹ

Kết quả khảo nghiệm có kiểm soát tính chịu hạn của giống dưa leo lai F1 CUMI 263 (sau khi gây hạn nhân tạo): Sau 3 ngày không tưới thì cây chỉ héo nhẹ và phục hồi khi trời mát.

Kết quả giá trị canh tác và giá trị sử dụng giống dưa leo lai F1 CUMI 263 đạt theo tiêu chuẩn cơ sở: TCCS 05:2020/SSC về giá trị canh tác, giá trị sử dụng của công ty cổ phần giống cây trồng miền Nam công bố và áp dụng.

4.2. Chỉ tiêu chất lượng hạt giống: Áp dụng theo TCVN 8814:2011

Chỉ tiêu	Hạt lai F1
- Độ sạch (% khối lượng, không nhỏ hơn):	99,0
- Tỷ lệ nảy mầm (% số hạt, không nhỏ hơn):	90
- Độ ẩm (% khối lượng, không lớn hơn):	8,0

4.3. Thông tin cảnh báo an toàn

- Hạt giống sau khi gieo trồng sẽ cho trái thương phẩm có ưu thế lai. Không sử dụng hạt của trái thương phẩm để làm giống cho những vụ sau.

4.4. Hướng dẫn bảo quản và sử dụng

- Điều kiện bảo quản: Hạt giống trước khi đem vào bảo quản phải sạch tạp chất, phơi sấy thật khô, đạt tới thủy phần an toàn trong bảo quản. Bảo quản trong điều kiện khô ráo, thoáng mát. Kiểm tra định kỳ tình trạng sức sống hạt giống (tỷ lệ nảy mầm), theo dõi phòng trừ sâu mọt, chuột phá hại.

- Thời hạn sử dụng: Theo khuyến cáo ngày sản xuất và hạn sử dụng in trên bao bì.

- Sử dụng quả: Dùng làm thực phẩm hoặc thức ăn chăn nuôi.....

- Thời vụ gieo trồng và vùng sản xuất: Có thể trồng quanh năm trên các chân đất tươi tiêu chủ động tại các vùng trồng dưa leo trên phạm vi cả nước.

Chúng tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin trong các văn bản kèm theo hồ sơ tự công bố lưu hành giống cây trồng./.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Trường Loan Lài

	CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM	Mã số: QT-CT-104
	QUY TRÌNH CANH TÁC GIỐNG DƯA LEO LAI F1 CUMI 263	Số trang: 1/ 2

I. Đặc điểm giống dưa leo lai F1 CUMI 263

Giống dưa leo lai F1 CUMI 263 là hạt giống lai F1 do Công ty Cổ phần Giống Cây trồng miền Nam nhập nội. Thu hoạch sau 32 ngày gieo trồng. Năng suất trung bình từ 32,5 – 60,0 tấn/ha. Cây sinh trưởng mạnh, chống chịu sâu bệnh tốt. Trái thon dài 18 – 20 cm, trọng lượng trái 105 – 120 gr, màu vỏ quả xanh trung bình, thịt dày, giòn ngon.

II. Thời vụ

Các tỉnh phía Bắc ở đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ, tập trung gieo trồng 2 vụ chính:

- Vụ Xuân: Từ tháng 2 đến tháng 3 dương lịch.
- Vụ Thu đông: Từ tháng 9 đến tháng 10 dương lịch.

Các tỉnh Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ gieo trồng quanh năm.

Chú ý: Không nên trồng dưa leo ở những vùng có mưa kéo dài, những vùng có nhiệt độ thấp (nhiệt độ dưới 15,5°C), thay đổi thất thường, chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm quá lớn, nhiệt độ thích hợp từ 15,5°C đến 35°C.

III. Chuẩn bị đất

- Nên chọn chân đất mới hoặc đã qua luân canh. Dọn sạch cỏ dại và tàn dư thực vật, cây 1 lượt (tiến hành bón vôi để xử lý và cải tạo đất, nên bón thêm các chế phẩm sinh học cải tạo đất và ngừa bệnh), bừa 1-2 lượt rồi ép mương lên lếp. Nên bố trí theo hướng Đông Tây để cây nhận được nhiều ánh sáng.
- Lếp trồng rộng 1,2-1,6 m tùy vùng. Nên dùng màng phủ nông nghiệp sẽ giúp hạn chế cỏ dại và bệnh lây lan từ đất vào mùa mưa.

IV. Mật độ và khoảng cách trồng

- Gieo hạt khô trực tiếp vào đất hoặc bầu, vĩ ươm cây con, mỗi hốc gieo 1-2 hạt, chỉ tưới vừa đủ ẩm sau khi gieo hạt. Gieo vào bầu, vĩ ươm sẽ giúp đảm bảo hạt lên đều và đủ số cây trồng ra ruộng, cây con được trồng ra đất sau khi nảy mầm 5-7 ngày.
- Khoảng cách trồng: Hàng cách nhau 0,8-1,4 m; khoảng cách lỗ 0,4-0,6 m tùy vào mùa vụ.
- Mật độ khoảng 25-40 ngàn cây/ha. Mùa mưa trồng thưa hơn mùa khô.

V. Bón phân

- Lượng phân bón đề nghị cho 1000 m²:

Loại phân	Lượng phân (kg)	Bón lót	Tưới thúc cây con 7-10 NSG	Thức lần 1 15 – 20 NSG	Thức lần 2 30-35 NSG
Vi sinh	100-200	100-200			
Vôi	50-100	50-100			
Super Lân	50-60	50-60			
DAP	12-14		2	5-6	5-6
Ure	12-14		2	5-6	5-6
NPK 16-16-8	50-80	20		20-30	20-30
KCL	10-15			5	5-10

- Nên phun các loại phân bón lá vi lượng để giúp cây luôn có bộ lá khỏe mạnh, xanh tốt. Có thể chia 2 lần bón thúc thành 3-4 đợt nhỏ tùy vào tình hình sinh trưởng của cây.

VI. Chăm sóc

- Trồng dặm: Sau khi gieo 3-5 ngày, kiểm tra ruộng và gieo dặm vào các hốc không có cây lên.

	<u>CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM</u>	Mã số: QT-CT-104
	QUY TRÌNH CANH TÁC GIỐNG DƯA LEO LAI F1 CUMI 263	Số trang: 2/ 2

- Tưới nước: Dưa leo cần tưới đầy đủ nước đặc biệt vào giai đoạn nuôi trái để đảm bảo năng suất. Tưới đủ nước vào mùa nắng sẽ làm giảm hiện tượng trái bị đắng trên dưa leo.
- Làm giàn: Sau khi gieo cần làm giàn cho dưa càng sớm càng tốt tránh để cây lớn làm giàn sẽ dễ làm gãy cây ảnh hưởng đến năng suất. Thông thường sẽ làm giàn chữ A với vật liệu làm giàn tùy theo địa phương như chà le, tre, cọc gỗ,...; có thể dùng dây nylon, lưới cước trắng, lưới đen,... cho dây leo lên.
- Làm cỏ: Để hạn chế sâu bệnh hại và cạnh tranh dinh dưỡng. Nhổ cỏ trong hốc và làm cỏ rãnh 1-2 lần tùy tình hình cỏ mọc kết hợp các đợt bón phân. Nếu trồng không trải màng phủ có thể kết hợp làm cỏ với vun gốc. Tuy nhiên rẽ dưa leo ăn cặn nên cần thận tránh làm tổn thương rễ khi nhổ cỏ hoặc vun gốc.

VII. Phòng trừ sâu bệnh

- Sâu hại: Một số loại sâu hại chính như *sâu vẽ bùa, bọ trĩ, sâu ăn tạp, sâu xám...* Cày ải, phơi đất, vệ sinh đồng ruộng. Rải thuốc hạt khử đất để diệt sâu, nhộng sống trong đất trước khi trồng. Nên bắt, xua đuổi thành trùng bằng tay, dùng vợt hay phun thuốc bảo vệ thực vật theo khuyến cáo tại địa phương để phòng trừ khi mật độ sâu hại còn thấp.
- Bệnh hại: Một số bệnh hại quan trọng như bệnh héo rũ cây con, bệnh đốm phấn, sương mai, bệnh thán thư, bệnh nứt thân chảy mủ, bệnh héo vi khuẩn và bệnh khảm ... Dùng thuốc bảo vệ thực vật theo khuyến cáo tại địa phương để phòng trừ bệnh hại.

VIII. Thu hoạch

Quả nên thu vào buổi sáng. Thời kỳ rộ quả nên thu hoạch quả thường xuyên không để quá lứa hoặc quả già có thể thu mỗi ngày một đợt.

TỔNG GIÁM ĐỐC
(ký tên và đóng dấu)



Trần Trường Lân Lại